



41.
6/1

40 Not

459

-6-

Oberschule f. B. Rempten/Allg.

Lehrerbücherei

S. D. I. / S. 161 Nr. 25/16

Johann Simon Kerner's,
Herzogl. Pfalz-Zweibrückischen Hofraths, öffentlichen Lehrers der Botanik an der Hohen Carls-Schule und
Aufsichters des Herzogl. Botanischen Gartens zu Stuttgart, auch der Kurpfälzisch-physikalisch-oekono-
mischen Gesellschaft zu Heidelberg, der Kurbairischen, Landwirthschaftlichen Wissenschaften zu
Burghausen, und der freyen oekonomischen Gesellschaft zu St. Petersburg Mitglied.

ABBILDUNG
ALLER
OEKONOMISCHEN
PFLANZEN.

Sechster Band.



STUTTGART,
gedruckt in der Druckerei der Herzoglichen Hohen Carls-Schule, 1793.



A. v. Leutrum gedr. v. Bothmer

PELLENZ
OÖKONOMISCHEN
ALLER
ABBILDUNG

2. Auflage

St. 1970.145



Pl. 501.

Abricot précoce L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 226.

503. **D**ie frühreifende Muskateller-Aprikose. *Abricot hatif Musqué.* *Bryants Verz.* v. Pflanz. I. 348. *Sukow angew. bot.* II. 303. *Mayer pomona franc.* I. 29. T. 2. f. 1. *Du Hamel* I. 133. T. I. Englisch. The masculine.

Sie ist klein, rund, der Hauptfarbe nach schön hochgelb, welche sich auf der Sonnenseite stark ins rothe zieht. Weil sie schon zu Ende des Junius reift, so verdient sie vor andern einen Vorzug.

Pl. 502.

Abricot de Hollande L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 226.

504. Orangenaprikose. Die holländische Aprikose. *Sukow angew. Bot.* II. 304. *Bryants Verz.* I. 349. *Mayer pom. franc.* I. 33. T. 3. f. 5. *Du Hamel* I. 138. T. 4. Englisch, The orange. Französisch, *Abricot d'orange*, *Amande Aveline*.

Trägt eine grössere Frucht als die vorhergehende, und wird hochgelb. Sie wird zu Torten gebraucht.

Pl. 503.

Abricot Commun L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 226.

505. Die grosse gemeine Aprikose. *Le gros Abricot ordinaire.* *Sukow angew. Bot.* II. 304. *Mayer pom. franc.* I. T. III. f. 3. *Du Hamel* I. 135. T. 2. *Müllers Gartenlexicon* I. 229. *Krunitz oekon. Encycl.* I. 418.

Die Frucht von dieser gewöhnlichen Art wird insgemein sehr schön und gros, rund, tiefgefurcht, auf der Schattenseite gelb, an der Sonne sehr hochroth.

Pl. 504.

Apricot pêche L. *Sukow angew. Bot.* II. 304.

506. Die Pfersich-Apricose. L'abricot pêche. *Mayer pom. franc.* I. 31. T. 3.

Die Grundfarbe ist blaßgelb, beinahe wie weißes wachs, und wird in der Sonne nur selten roth. Diese Sorte wird besonders zum Einmachen gebraucht.

Pl. 505.

Caucalis grandiflora L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 103.

507. Großblumige Haftdolde. *Linné Pflanzenyst.* IV. 40. *Syst. veg.* S. 275. ed. M. *yst. plant.* p. I. S. 664. ed. R. *Fl. succ.* 463. *Vaill. parif.* 81. *Pollich. hist.* 270. *Scop. Fl. Carn.* 308.

Wächst in Europa an Wegen und auf Aekern, und blühet im Julius und August; und ist als ein Unkraut bekannt.

Pl. 506.

Aegopodium podagraria L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 199.

508. Jessel. Geißfuß. Gem. Strenzel. Hinfuß. Gerardskraut. *Linn. syst. veg.* S. 292. ed. M. *yst. plant.* p. I. S. 726. ed. R. *Pflanzenyst.* VI. 209. *Pollich. hist.* 309. *Vaill. parif.* 13. *Scop. Fl. Carn.* 350. *Tournef. inst.* 313. *Sukow angew.* II. 566.

Er wächst bei uns häufig an gebauten und ungebauten Orten, und ist für Schaaf, Ziegen und Schweine ein gutes Futter.

1. Eine vergrößerte Blume.

Pl. 507.

Veronica Triphyllos L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 43.

509. Acker-Ehrenpreis. *Linn. S. V. S. 60. syst. plant.* p. I. S. ed. R. *Fl. Dan.* T. 627. *Pollich. hist.* 20. *Scop. Fl. Carn.* 25. *Hall. helv.* 551. *Linné Pflanzenyst.* V. 83.

Er wächst häufig auf Aekern, und ist als ein Unkraut bekannt.

1. Die Kapfel. 2. Aufgeschnitten. 3. Ein Saame.

Pl. 508.

Allium viviparum L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 110.

510. Eine neue Art Zwiebel, welche sich sehr leicht durch die Bulben vermehret.

Pl. 509.

Aira aquatica L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 110.

511. Wasserschmiele. Wasserschmelen. *Linn. syst. veg.* S. 112. ed. M. *syst. plant.* p. I. S. 177. ed. R. *Pollich. pal.* 77. *Scop. Fl. Carn.* 2. 94. *Oeder. Fl. dan.* T. 381. *Hall. helv.* 1471. *Scheuchz. gram.* 176. *Linn. Pflanzensyst.* XII. 305. *Gleditsch verm. Schrift.* III. 338. *Sukow angew. Bot.* II. 808.

Sie wächst auf feuchten Wiesen, und gibt ein nahrhaftes Gras, welches dem Vieh frisch und getrocknet gesund ist.

Pl. 510.

Vicia Sylvatica L. *Sukow angew. Bot.* II. 704.

512. Waldwicke. *Linn. syst. veg.* S. 664. ed. M. *syst. plant.* p. III. S. 470. ed. R. *Fl. suec.* 6031. *Mill. dict.* 2. *Gmel. Fl. sib.* 4. 11. *Scop. Fl. Carn.* 2. 890. *Hudson Fl. Angl.* T. I. 318. *Oeder Fl. Dan.* T. 277. *Hall. helv.* 426. T. 12. *Linne Pflanzensyst.* VIII. 611. *Sukow a. a. O.*

Sie findet sich bei uns in Wäldern.

1. Eine halbzeitige Hülse.

Pl. 511.

Glycine Apios L. *Sukow angew. Bot. II. 698.*

513. Knollige Glycine. Amerikanische Erdnuss. *Linn. S. V. S. 660. ed. M. fyst. plant. p. III. S. 455. ed. R. Mill. dict. 1. Linné Pflanzenfyst. VIII. 176. Sukow a. a. O.*

Sie wächst in Nordamerika, wo die knolligen Wurzeln, welche den Artischocken ähneln, als Brod gegessen, und die Bohnen, wie unsere Hülsenfrüchte benutzt werden.

1. Eine Blume.

Pl. 512.

Xanthium Strumarium L. *Sukow angew. Bot. II. 573.*

514. Gemeine Spizklette. Bettlersläufs. Igelkletten. Kropfkletten. *Linn. S. V. S. 852. ed. M. fyst. plant. p. IV. S. 137. ed. R. Fl. suec 778. Scop. Fl. Carn. 2. 1177. Hall. helv. 1621. Blackw. T. 444. Sukow a. a. O. Gaad Schwed. Abh. XXIX. 149.*

Sie wächst in Teutschland und überhaupt in Europa an ungebauten Orten wild.

1. Eine entzweigefchnittene Frucht. 2. Der Saame.

Pl. 513.

Sempervivum tectorum L. *Sukow angew. Bot. II. 660.*

515. Hauswurz. *Linn. fyst. veg. S. 455. ed. M. fyst. plant. p. II. S. 459. ed. R. Pollich. hist. 464. Hall. hist. 949. Scop. Fl. Carn. 559. Oeder Fl. Dan. T. 601. Blackw. T. 366. Linn. Pflanzenfyst. VII. 91. Sukow a. a. O.*

Sie wächst in Europa auf Dächern, Mauren und Felsen. Das Kraut ist officinell.

1. Der Blumenboden mit einem vergrößerten Staubfaden. 2. Eine Saamenkapfel. 3. Saamen.

Pl. 514.

Brassica oleracea rubra L. *Beckmann Landwirthschaft. §. 162.*

516. Rother Kopfkohl. *Sukow angew. bot. II. 617. Spielmann 34. Lueders Briefe 8. 36. 276. oek. Nachr. IV. 654. Reichart gem. Schrift. 44.*

Seine Köpfe haben eine rothe Farbe.

Pl. 515.

Pl. 515.

Anethum Dulce L. *Beckmann* Landwirthschaft. §. 195.

517. Der süsse Fenchel. *Sukow*. angew. bot. II. 563. *Miller* I. 166. *J. Bauh.* III. 24.

Ist eine Abart von dem gewöhnlichen gemeinen Fenchel. (*A. faniculum* L.)

1. Saamen.

Pl. 516.

518. Die Gurkelrübe. Gukelrübe. *Sukow* angew. Bot. II. 621. *Reichert* IV. 170.

Mit langer, weisser, zum Theil aus der Erde hervorstehender, fleischiger, weicher und milder Wurzel.

Pl. 517.

Anthemis Arvensis L. *Beckmann* Landwirthschaft. §. 103.

519. Akerchamille. *Linn.* syst. veg. S. 716. ed. M. syst. plant. p. III. S. 862. ed. R. Fl. suec. 704. 768. *Scop.* Fl. Carn. 2. 1091. *Pollich.* pal. 816. *Hudson.* Fl. Angl. T. II. 373. *Hall.* helv. 103. *Linn.* Pflanzensyst. IX. 509. *Sukow* angew. Bot. II. 759.

Ein Unkraut auf unsern Feldern.

1. Der Blumenboden. 2. Ein Saame.

Pl. 518.

Populus Tremula L. *Beckmann* Landwirthschaft. §. 269.

520. Espe. Asche. Flitterespe. Zitterpappel. Ebenesche. *Linn.* syst. veg. S. 889. ed. M. syst. plant. p. I. S. 292. ed. R. *Hall.* helv. 156. *Gmel.* Fl. sib. I. 151. *Pollich.* hist. 929. *Scop.* Fl. Carn. 1224. *Camer.* epit. 67. *Linné* Pflanzensyst. II. 448. *Cramer* T. 13. *Kerners* Bäume T. 27. *Schrebers* Cam. Schrift. III. 540. *Sukow* angew. Bot. II. 195. *Du Roi* II. 148. *Gleditsch* Forstw. I. 535. Franzöf. Tremble. Englisch, Asp.

Sie wächst häufig in unsern Waldungen. Für das Wild und die Schaaf sind die Blätter ein gutes Futter.

1. Ein männliches Käzgen. 2. Eine Schuppe mit den Staubfäden. 3. Weibliches Käzgen. 4. Der Fruchtknoten mit den Narben. 5. Die Saamenkapsel. 6. Ein haariger Saame. 7. Ein Zweig mit Blätter.

Pl. 519.

Pl. 519.

Cheiranthus incanus L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 198.

521. Winterlevcoje. *Linn. syst. veg.* S. 597. ed. M. *syst. plant.* p. III. S. 465. ed. R. *Linné Pflanzenyst.* VIII. 314. *Sukow angew. Bot.* II. 614.

Franzöf. Violier, Geroflée. Englisch, Stock Gilly flower.

Ist wahrscheinlich im südlichen Europa einheimisch, und liefert die bekannte Garten-Levcoje.

1. Eine aufgesprungene und zeitige Schoote. 2. Ein Saame.

Pl. 520.

Arbutus uva ursi L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 277.

522. Bärentraube. Sandbeere. *Linn. syst. veg.* S. 408. ed. M. *syst. plant.* p. II. S. 208. ed. R. *Fl. suec.* 358. *Hall. helv.* 415. *Gmel. fl. sib.* IV. 118. *Scop. Fl. Carn.* 483. *Oeder Fl. Dan.* T. 33. *Blackw. T.* 592. *Linn. Pflanzenyst.* III. 578. *Sukow angew. Bot.* II. 228. *Du Roi I.* 69. *Gleditsch Forstw.* II. 172. *Lewis hist. de Forb* 167. *Murray Comment. de Arbuto*, Gætt. 1765.

Franzöf. Raisin d'Oues oder Busslerole. Englisch, Bearberry.

Er wächst bei uns, so wie überhaupt in Europa und Nordamerika wild. In Schweden wird er zur Bereitung der schwarzen Biberfarbe gebraucht; auch kann das ganze Gewächs zum Gerben dienen.

1. Der Kelch.

Pl. 521.

Aristolochia Clematitis L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 191.

523. Gemeine Aristolochie. Osterluzey. *Linn. syst. veg.* S. 825. ed. M. *syst. plant.* p. IV. S. 61. ed. R. *Scop. Fl. Carn.* 1137. *Hall. hist.* 1029. *Pollich. hist.* 863. *Blackw. T.* 255. *Linné Pflanzenyst.* IV. 488. *Sukow. angew. Bot.* II. 783.

Wächst im südlichen Europa wild, und ist officinell.

1. Die Staubfäden mit den Fruchtknoten. 2. Eine zeitige Frucht. 3. Ein Saame.

Pl. 522.

Pl. 522.

Ribes rubrum L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 226.

524. Johannisbeeren. Johannisträublein. *Linn. syst. veg.* S. 242. ed. M. *syst. plant.* p. I. S. 564. ed. R. *Fl. suec.* 205. *Pollich. hist.* I. 233. *Blachw. T.* 285. *Cramer T.* 38. *Hall. helv.* 346. *Tournef. inst.* 639. *Linné Pflanzenfyst.* III. 295. *Sukow angew. bot.* II. 119. *Du Roi II.* 309. I. 312. *Hausvater III.* 433. *Mönchs Verz.* 103. *Du Hamel I.* 256. T. I. Franzöf. *Groseiller à gros fruit rouge.*

Er wächst bei uns in Holzungen und Feldbüschen wild, und kann durch Cultur und Okuliren so sehr veredelt werden, daß seine Fruchttrauben viel größer, und die Beere, wie kleine Weinbeere ausfallen.

1. Eine Blume. 2. Die Staubfäden. 3. Einer vergrößert. 4. u. 5. Saamen.

Pl. 523.

Asperula tinctoria L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 310.

525. Färber-Meyerkraut. *Linn. syst. veg.* S. 149. ed. M. *syst. plant.* p. I. S. 295. ed. R. *Sukow angew. Bot.* II. 472. *Linné Gothländ. Reise* 256. *Schwed. Abh.* IV. 27. VIII. 288.

Es wächst auf Heiden und bergigen Gegenden, und wird besonders in Schweden wegen seiner stark rothfärbenden Wurzel benutzt.

Pl. 524.

Melampyrum Arvense L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 103.

526. Kuhweizen. Wachtelweizen. Ackerkuhweizen. *Linn. S. V. S.* 550. ed. M. *syst. plant.* p. III. S. III. ed. R. *Hall. helv.* 310. *Pollich. pal.* 585. *Linn. Pflanzenfyst.* VIII. 17. *Sukow angew. Bot.* II. 507. *Schwed. Abh.* XIX. 196.

Er macht auf unsern Aekern und Wiesen ein gemeines Unkraut, und wenn die Saamen von ihm viel unter das Getraide kommen, machen sie das Meel bläulich und bitter.

Pl. 525.

Cynara Scolymus L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 192.

527. Artischocken. *Linn. syst. veg.* S. 728. ed. M. *syst. plant.* p. III. S. 692. ed. R. *Milt. dict. n. 1.* *Blackw. T.* 458. *Linné Pflanzenfyst.* IX. 190. *Sukow angew. bot.*

bot. II. 731. *Miller* I. 243. *Reinhard* IV. 67. *De Combe* 115. v. *Justi* oekon. Schrift. II. 182.

Wild wächst sie in Italien. In unsern Gärten finden sich folgende Abarten:
1) Die *rothe Artischoke*. 2) Die *grüne* oder *französische Artischoke*. 3) Die *stachlichte Artischoke*.

1. Eine einzelne Zwitterblume.

Pl. 526.

528. Eine noch nicht aufgegangene Blume, so wie solche Köpfe oder Blumenknospen zum essen von den Pflanzen abgenommen werden.

Pl. 527.

Cynara Cardunculus L. *Beckmann* Landwirthschaft. §. 193.

529. Cardonen. Spanische Carden. *Linn.* syst. veg. S. 728. ed. M. syst. plant. p. III. S. 692. ed. R. *Mill.* dict. 3. *Tabern* hist. 1075. *Linné* Pflanzensyst. IX. 191. *Sukow* angew. Bot. II. 732. *Miller* I. 955. *De Combe* 101.

Sie wächst auf der Insel Candien. Man pflegt die Stengel, nachdem sie gebleicht worden, wie Artischoken zur Speise zu nuzen.

1. Eine Blume mit dem Saamen.

Pl. 528.

Lathyrus aphaca *Linné* Pflanzensyst. VIII. 591.

530. Blatloose. Platerbse. *Linn.* syst. veg. S. 662. ed. M. syst. plant. p. III. S. 461. ed. R. *Tournef.* inst. 309. *Mill.* dict. 18. jc. T. 43. *Scop.* Fl. Carn. 887. *Pollich.* pal. 675. *Hall.* helv. 442. *Hudson.* Fl. Angl. T. I. 315.

Sie wächst größtentheils in Europa unter dem Getreide, und ist als ein Unkraut anzusehen.

1. Ein Saame.

Pl. 529.

Ranunculus arvensis L. *Beckmann* Landwirthschaft. §. 103.

531. Akerhahnenfuß. *Linn.* syst. veg. S. 518. ed. M. syst. plant. p. II. S. 665. ed. R. Fl. suec. 508. *Kram.* austr. 161. *Pollich.* hist. 537. *Scop.* Fl. Carn. 673. *Hall.*

Hall. hist. 1176. *Oeder Fl. Dan.* T. 219. *Linn. Pflanzenfyst.* VII. 358. *Sukow. angew. bot.* II. 665.

Sie wächst auf unsern Getreidefeldern.

1. Die Staubfäden. 2. Die zeitige Saamen.

Pl. 530.

Betula incana L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 265.

532. Weiße Eller. Die nordische weiße Erle. *Linn. fyst. veg.* S. 849. ed. M. *fyst. plant.* p. IV. S. 127. ed. R. v. *Haller* 1631. *Du Roi* 109. *Gleditsch. Forstw.* I. 33. *Schwed. Abh.* XXVI. 222. *Forstmagazin* I. 218.

Sie wächst in Schweden, Norwegen und in der Schweiz. — In Norwegen bedient man sich der jungen Sprösslinge zum Schaaffutter.

Pl. 531.

Ribes alpinum L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 278.

533. Die wilde Johannisbeere. Straußbeere. Bergbeere. Rechbeere. Wilde Corinthen. Falsche Rosinlein. *Linn. fyst. veg.* S. 233. ed. M. *fyst. plant.* p. I. S. 565. ed. R. *Pollich. hist.* I. 234. *Linné Pflanzenfyst.* III. 297. *Du Roi* II. 313. *Cramer Tab.* 38. *Sukow. angew. bot.* II. 120.

Er findet sich bei uns wild. Die Beeren sind klein, roth, unschmakhaft und schleimig.

1. Eine vergrößerte Blume. 2. Ein vergrößerter Staubfaden. 3. Das Pistill. 4. Ein Saame. 5. Dieser vergrößert.

Pl. 532.

Viburnum Opulus L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 277.

534. Wasserholder. Hirschholder. Schwalken. Kalinken. Gemein. Schneeballen. Sumpfhollunder. *Linn. fyst. veg.* S. 294. ed. M. *fyst. plant.* p. I. S. 734. ed. R. *Fl. suec.* 264. *Scop. Fl. Carn.* 370. *Pollich. hist.* 311. *Mill. dict.* 7. *Hall. hist.* I. 297. *helv.* 464. *Cramer Forstw.* 39. *Linn. Pflanzenfyst.* III. 354. *Sukow angew. Bot.* II. 142. *Du Roi* II. 477. *Gleditsch* 988. *Kerners Bäume* T. 35.

Franzöf. Obier, Sureau aquatique. Englisch, Water-Elder.

Er ist bei uns einheimisch, und erreicht eine Höhe von 8 bis 10 Schuh.

1. Zwitterblumen. 2. Eine vergrößerte. 3. Ein vergrößerter Staubfaden. 4. Der Kelch. 5. Die Narbe. 6. Eine Blume aufgeschnitten. 7. Eine geschlechtslose Blume. 8. Der Kelch davon. 9. Der Stiel. 10. Die zeitige Früchten. 11. Eine aufgeschnitten. 12. 13. Saamen.

Pl. 533.

Prunus infititia L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 225.

535. Der zahme Schlehenbaum. Kriechen. Pflaumen- Schlee. *Linn. syst. veg.* S. 463. ed. M. *syst. plant.* p. II. S. 498. ed. R. *Hudson Fl. Angl.* 186. *Linné Pflanzen syst.* I. 752. *Sukow angew. bot.* II. 302. *Du Roi* II. 165. *Hausvater* III. 365. *Kerner Bäume* T. 29.

Dieser Strauch wächst nur mäßig hoch, und wird in Teutschland in verschiedenen Gegenden angetroffen.

1. Zwitterblumen. 2. Eine aufgeschnitten. 3. Ein vergrößerter Staubfaden. 4. Ein Blumenblatt. 5. Das Pistill. 6. Zeitige Früchten. 7. Eine aufgeschnitten. 8. 9. 10. Saamen.

Pl. 534.

Teltower-Rüben L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 167.

436. Bösfeldische Rüben. Bobenhäuser. Jettinger Rüben. Wilhelmsburger Rüben. *Sukow angew. Bot.* II. 621. *Reichart* III. 167-175. *Lueder* 419.

Durch den Saamen artet diese Rübenart leicht aus, und die verschiedene Namen hängen blos von der Territorial-Eigenheit ab, wo solche gebaut werden.

Pl. 535.

Erica Vulgaris L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 290.

537. Heidekraut. Heide. *Linn. syst. veg.* S. 363. ed. M. *syst. plant.* p. II. S. 168. ed. R. *Fl. suec.* 336. *Hall. hist.* 1012. *Scop. Fl. Carn.* 460. *Pollich. hist.* 378. *Mill. dict.* 1. *Linné Pflanzen syst.* III. 424. *Sukow angew. Bot.* II. 189. *Cramer* T. 52. *Du Hamel* I. 159. *Gleditsch Forstw.* I. 323.

Franzöf. Bruyere. Englisch, Henth oder Ling.

Diese Heidenart ist bei uns gemein, und pflegt oft ganze Gegenden zu überziehen. Sie gehört zu den schädlichsten Waldunkräutern.

1. Eine

1. Eine vergrößerte Blume. 2. Der Kelch. 3. Die Blumenblätter. 4. Die Staubfäden. 5. Einer vergrößert. 6. Das Pistill.

Pl. 536.

Tanacetum Vulgare L. *Beckmann Landwirthschaft*. §. 130.

538. Gemeine Reinfarren. Wurmfarren. Weinfarren. Wurmkraut. Revierkraut. Rheinfalkkraut. *Linn. syst. veg.* S. 742. ed. M. *syst. plant.* p. III. S. 736. ed. R. *Fl. suec.* 666. *Kram. austr.* 243. *Gmel. Fl. sib.* II. 133. *Pollich. pal.* 779. *Hudson. Fl. Angl.* T. II. 357. *Hall. helv.* 132. *Linné Pflanzenyst.* IX. 261. *Sukow angew. bot.* II. 739.

Franzöf. Tanaise. Englisch, Tansey.

Diese Pflanze wächst in ganz Europa häufig an ungebauten Orten, und gehört unter die Unkräuter.

Pl. 537.

Sambucus Laciniata L. *Beckmann Landwirthschaft*. §. 277.

539. Peterfiliienblätteriger Hollunder. *Linn. syst. veg.* S. 296. ed. M. *syst. plant.* p. I. S. 737. ed. R. *Sukow angew. Bot.* II. 146. *Du Roi* II. 413. *Medikus Kurpf.* Bemerkung. 1774. 214.

Dieser Strauch ist sehr dauerhaft, und empfiehlt sich vorzüglich durch die Schönheit seiner Blätter.

Pl. 538.

Bupleurum rotundifolium L. *Beckmann Landwirthschaft*. §. 103.

540. Durchwachs. *Linn. syst. veg.* S. 273. ed. M. *syst. plant.* p. I. S. 654. ed. R. *Mitt. dict.* 1. *Pollich. hist.* 266. *Scop. Fl. Carn.* 346. *Hall. hist.* 767. *Blackw. T.* 95. *Linné Pflanzenyst.* VI. 20. Franzöf. Perecefexille. Englisch, Thoroughwas.

Diese Pflanze findet man beinahe in ganz Europa auf Aekern an Wegen und in Weinbergen. Nach *Miller* sind Saamen und Blätter officinell.

1. Eine Blume. 2. Der Saamen.

Pl. 539.

Pl. 539.

Rubus fruticosus L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 278.

541. Der Brombeerstrauch. *Linn.* syst. veg. S. 475. ed. M. syst. plant. p. II. S. 534. ed. R. Fl. suec. 444. *Mill.* dict. n. 1. *Scop.* Fl. Carn. 613. *Pollich.* hist. 490. *Hall.* hist. 1109. *Blackw.* T. 45. *Du Hamel* II. 180. T. 55. *Linné* Pflanzensyst. III. 678. *Du Roi* II. 372. *Gleditsch* Forstw. II. 255. *Kriinitz* oek. Encyclop. VI. 779. *Hausvater* III. 476. V. 291. *Sieffert* II. 154. Franzöf. Ronce. Englisch, Bromboer oder Blackberries.

Er wächst bei uns häufig an ungebauten Orten, und überzieht oft ganze Strecken in Waldungen.

1. Eine zeitige Frucht.

Pl. 540.

Carduus nutans L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 103.

542. Die Biesam - Distel. *Linn.* syst. veg. S. 724. ed. M. syst. plant. p. III. S. 675. ed. R. Fl. suec. 655. 717. *Gmel.* Fl. sib. II. 42. *Scop.* Fl. Carn. II. 1011. *Pollich.* pal. 763. *Hudson* Fl. Angl. T. II. 340. *Oeder* Fl. Dan. T. 675. *Hall.* helv. 167. *Linn.* Pflanzensyst. IX. 147. *Sukow.* angew. Bot. II. 728.

Er wächst bei uns häufig an gebauten und ungebauten Orten.

Pl. 541.

Salsola Kali L. *Sukow angew. Bot.* II. 544.

543. Rauhlätteriges Sodakraut. Salzkraut. *Linn.* syst. veg. S. 263. ed. M. syst. plant. p. I. S. 624. ed. R. Fl. suec. 225. *Roy* Lugdb. 220. *Mill.* dict. n. 1. *Camm.* Epit. 779. *Morif.* hist. II. T. 33. f. II. *Sukow.* a. a. O.

Wächst an Europäischen Seestranden.

Pl. 542.

Trifolium Arvense L. *Sukow angew. Bot.* II. 712.

544. Haafenklee. Feldklee. Akerklee. Kazenklee. Haafenpfötchen. *Linn.* syst. veg. S. 689. ed. M. syst. plant. p. III. S. 555. ed. R. Fl. suec. 616. 686. *Mill.* dict. 9. *Pollich.* pal.

pal. 703. *Oeder* Fl. Dan. T. 724. *Hudson* Fl. Angl. T. I. 326. *Scop.* Fl. Carn. I. 526.
Hall. helv. 373. *Camm.* Epit. 724. *Blackw.* T. 450. *Linné* Pflanzenfyst. VIII. 733.
Sukow. a. a. O. Franzöf. La patte de Lievre.

Er wächst bei uns häufig auf gebauten und ungebauten Feldern, und ist von *Gleditsch* zur Gerberei empfohlen.

1. Eine Blume. 2. Der Kelch. 3. Eben dieser vergrößert.

Pl. 543.

Brassica Capitata fimbriata L. *Beckmann* Landwirthschaft. §. 162.

545. Butterkraut. Grüner Krausen Kohl. *Brassica Laciniata*. *Lueder* Küchengewächse I. Bd. *Brassica oleracea Laciniata*. *Mawe.* C. B. *Bauh.* pin. *Walter* Gartenkunst. 343.

Eine Art Kohl, welche bei guter Behandlung, wann solche in einen guten Boden gepflanzt werden, sehr delicat wird.

Pl. 544.

546. Ein gut ausgewachsenes Butterkraut, so wie man es zu verspeisen pflegt.

Pl. 545.

Chaerophyllum Sylvestre L. *Beckmann* Landwirthschaft. §. 121.

547. Wilder Kälberkern. Kerbel. Kuhpeterlein. Eselpeterlein. *Linn.* fyst. veg. S. 288. ed. M. fyst. plant. p. I. S. 710. ed. R. Fl. suec. 257. *Tournef.* inst. 114. *Will.* dict. 1. *Pollich.* hist. 298. *Scop.* Fl. Carn. 366. *Hall.* hist. 748. *Linné* Pflanzenfyst. VI. 163.

Wächst in ganz Europa auf Wiesen, in Obstgärten und an andern Orten als ein Unkraut. Nach *Gmelin* soll die Wurzel dem Rindvieh schädlich seyn.

Pl. 546.

Chærophylum temulum L. *Beckmann* Landwirthschaft. §. 140.

548. Betäubender Kälberkopf. *Linn.* fyst. veg. S. 288. ed. M. fyst. plant. p. I. S. 710. ed. R. *Mill.* dict. n. 3. *Pollich.* hist. 300. *Linné* Pflanzenfyst. VI. 166.

Diese

Diese Art wächst fast überall in Europa an Heken und Strassen, auf Brachfeldern und andern Orten mehr. Nach Herrn *Pallas* Beobachtung, ist diese Pflanze den Menschen schädlich.

1. Eine vergrößerte Blume. 2. Ein Saame.

Pl. 547.

Chenopodium album L. *Beckmann* Landwirthschaft. §. 103.

549. Weisser Gänsefuß. *Linn.* S. V. S. 261. ed. M. syst. plant. p. I. S. 618. ed. R. Fl. suec. 218. *Hall.* helv. 174. *Pollich.* hist. 249. *Linné* Pflanzenyst. V. 804. *Sukow* angew. Bot. II. 540.

Er findet sich häufig an ungebauten Orten und ist ein gewöhnliches Unkraut.

1. Die Staubfäden vergrößert. 2. Ein Saame vergrößert.

Pl. 548.

Chenopodium Viride L. *Beckmann* Landwirthschaft. §. 103.

550. Grüner Gänsefuß. *Linn.* S. V. S. 262. ed. M. syst. plant. p. I. S. 619. ed. R. *Kram.* austr. 63. *Pollich.* hist. 250. *Scop.* Fl. Carn. 280. *Linné* Pflanzenyst. V. 805. *Sukow.* angew. Bot. II. 540.

Diese Art wächst überall in Europa an Heken und Wegen als ein häufiges Unkraut. Er kann als Gemüse gekocht werden.

1. Die Staubfäden vergrößert. 2. Ein Saame, vergrößert.

Pl. 549.

Chenopodium hybridum L. *Beckmann* Landwirthschaft. §. 199.

551. Bastard-Gänsefuß. Unächter Gänsefuß. *Linn.* S. V. S. 262. ed. M. syst. plant. p. I. S. 619. ed. R. Fl. suec. 220. *Pollich.* hist. 251. *Vaill.* paris. 36. T. 7. f. 2. *Linné* Pflanzenyst. V. 806. *Sukow* angew. bot. II. 540.

Er findet sich mit den vorhergehenden Arten an gleichen Orten, und macht mit diesen ein gewöhnliches Unkraut aus.

1. Der Kelch. 2. Die Staubfäden. 3. Einer vergrößert.

Pl. 550.

Chenopodium polyspermum L. *Beckmann* Landwirthschaft. §. 199.

552. Vielsaamiger Gänsefuß. *Linn.* syst. veg. S. 262. ed. M. syst. plant. p. I. S. 621. ed. R. *Scop.* Fl. Carn. 239. *Pollich.* hist. 254. *Lob.* ic. 256. hist. 128. *Sukow* angew. bot. II. 542.

Wächst bei uns an gebauten Orten, und ist als Unkraut gemein.

1. Eine vergrößerte Blume.

Pl. 551.

Pl. 551.

Chrysanthemum Leucanthemum L. *Beckmann* Landwirthschaft. §. 103.

553. Gänseblume. Groſſe Maslieben. Johannisblume. Rindsauge. Kühblume. *Linn.* ſyſt. veg. S. 772. ed. M. ſyſt. plant. p. III. S. 845. ed. R. Fl. ſuec. 700. 763. *Mill.* dict. n. 2. *Pollich.* pal. 812. *Gmel.* Fl. Tub. 260. *Hudson* Fl. Angl. T. II. 371. *Blackw.* T. 42. *Hall.* helv. 98. *Scop.* Fl. Carn. I. 373. *Tournef.* inſt. 492. *Linné* Pflanzenſyſt. IX. 469. *Sukow* angew. bot. II. 757.

Ein gemeines Unkraut in Europa, auf Wiefen und graſſigen Plätzen.

Pl. 552.

Hysopus officinalis L. *Beckmann* Landwirthschaft. §. 195.

554. Ilöp. *Linn.* ſyſt. veg. S. 529. ed. M. ſyſt. plant. p. III. S. 29. ed. R. mat. med. 290. *Kramer* auſtr. 167. *Blackw.* T. 296. *Lob.* ic. 433. *Linné* Pflanzenſyſt. VII. 421. *Sukow* angew. Bot. II. 490. *Reichart* IV. 202. *Bryants* Verz. I. 200.

Franzöſ. Hyſope. Engliſch, Common Hyſop.

Sein wahres Vaterland ſoll noch nicht entſchieden ſeyn, wahrſcheinlich wächst er in Europa wild. In unſern Gärten wird er als Gewürzpflanze gezogen.

1. Der Kelch. 2. Eine Blume.

Pl. 553.

Die Mayrübe L. *Beckmann* Landwirthschaft. §. 167.

555. Die Mayrübe. Tellerrübe. Frührübe. *Sukow* angew. Bot. II. 620. *Spielmann* I. 44. *Reichart* III. 167. *Lueder* 370.

Eine ſehr frühe Rübenforte, welche eine breite, weiſſe und Tellerförmige Wurzel hat.

Pl. 554.

Cornus alba L. *Beckmann* Landwirthschaft. §. 277.

556. Weiſſer Cornelbaum. *Linn.* ſyſt. veg. S. 159. ed. M. ſyſt. plant. p. I. S. 332. ed. R. *Linné* Pflanzenſyſt. I. 224. (*Miller* I. 840. *C. tatarica*.) *Du Roi* I. 165. *Pallas* Fl. Roſſica I. T. 34.

H

Er

Er wächst in Sibirien und Canada. Bei uns dauert er sehr gut aus, und empfiehlt sich für unsere Pflanzungen.

1. Eine Zwitterblume. 2. Ein Saame.

Pl. 555.

Cratægus Aria L. *Beckmann Landwirthschaft*. §. 277.

557. Mehlbeerbaum. Mehlfäßerchen. Opelbaum. Thelsbirle. *Linn. syst. veg.* S. 464. ed. M. *syst. plant.* p. II. S. 491. ed. R. *Fl. suec.* 433. *Hall. helv.* 353. *Oeder Fl. Dan.* T. 302. *Scop. Fl. Carn.* 591. *Hall. hist.* 1089. *Tournef. inst.* 633. *Linné Pflanzenfyst.* I. 759. *Sukow angew.* II. 316. *Kerners Bäume* T. 26. *Gleditsch Forstw.* II. 149. *Ehrhard Pyrus Aria.* *Du Roi* I. 190.

Er ist in Europa einheimisch, und erreicht in unsern Waldungen eine Höhe von 30 bis 40 Schuh.

1. Zwitterblumen. 2. Eine einzel. 3. Der Kelch. 4. Die Staubfäden. 5. Der Kelch mit den Pistillen vergrößert. 7. Die Zeitige Beeren. 8. Eine einzel. 9. u. 10. Aufgeschnitten. 11. Ein Saame. 12. Vergrößert.

Pl. 556.

Scherardia arvensis *Linné Pflanzenfyst.* V. 261.

558. Aker-Scherardin. *Linn. syst. veg.* S. 148. ed. M. *syst. plant.* p. I. S. 292. ed. R. *Fl. suec.* 120. *Scop. Fl. Carn.* 143. *Hall. hist.* 734. *Hill. veg.* T. 28. *Oeder. Fl. dan.* T. 439. *Pollich. hist.* 144.

Sie wächst in Europa auf Aekern und in Gärten, und gehört unter die Unkräuter.

1. Der Kelch. 2. Eine vergrößerte Blume. 3. Ein Saame.

Pl. 557.

Cucurbita pepo L. *Beckmann Landwirthschaft*. §. 188.

559. Pfeben-Kürbis. Pfeben. *Linn. syst. veg.* S. 868. ed. M. *syst. plant.* p. IV. S. 203. ed. R. *Mill. dict. n.* 2. *Tournef. inst.* 105. *Rai hist.* 639. *Linné Pflanzenfyst.* X. 239. *Sukow angew. Bot.* II. 770. *Scop. annuus hist. nat.* II. 97. *Schriften d. Berner Gesell.* 1768. II. 85.

Sein eigentliches Vaterland ist unbekannt. Nach *Scopoli* liefern die Saamen ein Oel, und mit etwas Waizenmehl vermischt, können dieselbe zu Brod verbraucht werden.

1. Das Pistill.

Pl. 558.

560. Die zeitige Frucht von der Kirbis.

Pl. 559.

Cucurbita Verrucosa L. *Beckmann* Landwirthschaft. §. 188.

561. Die Warzenkirbis. *Linn.* syst. veg. S. 868. ed. M. syst. plant. p. IV. S. 203. ed. R. *Mill.* dict. 3. *Tournef.* inst. 106. *Linn.* Pflanzen syst. X. 241. *Sukow* angew. bot. II. 770. *Medikus* Bot. Beob. 1782. 260.

Man zieht sie blos zur Abwechslung und Zierde in Gärten.

Pl. 560.

Dracocephalum moldavica L. *Beckmann* Landwirthschaft. §. 195.

562. Türkische Melisse. Moldavischer Drachenkopf. *Linn.* syst. veg. S. 543. ed. M. syst. plant. p. III. S. 88. ed. R. mat. med. 292. *Mill.* dict. n. 3. *Blackw.* T. 551. *Tournef.* inst. 184. *Linn.* Pflanzen syst. VII. 548. *Sukow* angew. Bot. II. 503. *Krause* Gärtnerei 618.

Diese Pflanze wächst in der Moldau und in Sibirien, und wird wegen ihrem angenehmen Geruch unter den Gewürzpflanzen in Gärten gezogen.

1. Der Kelch. 2. Eine Blume.

Pl. 561.

Elæagnus angustifolius L. *Beckmann* Landwirthschaft. §. 277.

563. Der schmalblättrichte wilde Oelbaum. Oleaster. *Linn.* S. V. S. 163. ed. M. syst. plant. p. I. S. 343. ed. R. *Hort.* Cliff. 33. *Tournef.* inst. 53. *Mill.* dict. n. 2. *Linn.* Pflanzen syst. III. 129. *Sukow.* angew bot. II. 66. *Du Roi* I. 219. *Medikus* Kurpf. Bemerk. 1774. 193. *Du Hamel* I. 153. *Miller* II. 109. *Medikus* Beitr. zur schönen Gartenk. 306. 323. *Mönchs* Verz. 39. *Pallas* Fl. Ros. T. 4.

Franzöf. Olivier Sauvage. Englisch, Oleaster, wild olive.

Er findet sich in den südlichen Gegenden Europens. Nach *Forskohl* werden seine Früchten zu Constantinopel gegessen.

Pl. 562.

Erysimum barbarea L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 163.

564. Barbenkraut. Barbara-Hederich. *Linn.* syst. veg. S. 596. ed. M. syst. plant. p. III. S. 260. ed. R. Fl. suec. 557. 599. *Murray* app. med. 285. *Berg.* mat. med. 357. *Scop.* Fl. Carn. 826. *Pollich.* pal. 632. *Hudson.* Fl. Angl. T. I. 286. *Hall.* helv. 479. *Tournef.* inst. 226. *Linné* Pflanzen syst. VIII. 306. *Sukow* angew. Bot. II. 614.

Es wächst in Europa wild, und kann in Gärten als eine antiscorbutische Salat-Pflanze gezogen werden.

Pl. 563.

Erysimum Alliaria L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 140.

565. Knoblauchs-kraut. *Linn.* syst. veg. S. 596. ed. M. syst. plant. p. III. S. 260. ed. R. Fl. suec. 558. 600. *Murr.* app. med. 284. *Hall.* helv. 480. *Scop.* Fl. Carn. 825. *Hudson* Fl. Angl. T. I. 286. *Blackw.* T. 372. *Linné* Pflanzen syst. VIII. 307. *Sukow* angew. Bot. II. 614.

Es findet sich auf Feldern und an Zäunen. Das Rindvieh frisst es, dessen Fleisch und Milch aber einen üblen Geschmack davon bekommt.

Pl. 564.

Fagus Sylvatica L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 264.

566. Rothbuche. Maßbuche. Tragebuche. Gemeine Buche. *Linn.* Syst. veg. S. 859. ed. M. syst. plant. p. IV. S. 167. ed. R. Fl. suec. 871. mat. med. 428. *Scop.* Fl. Carn. 1188. *Tournef.* inst. 584. *Hall.* helv. 160. *Pollich.* hist. 1616. *Du Roi* I. 230. *Linné* Pflanzen syst. II. 332. *Cramer* T. 3. v. *Oelhaven* II. T. 6. 7. 8. v. *Burgsdorf* Holzarten I. T. 1-27. *Sukow* angew. bot. II. 273. *Du Hamel* I. 165. *Gleditsch* verm. Abh. II. 417. *Forstw.* I. 463. *Forstmagaz.* II. 6. *Krünitz* oek. encycl. VII. 271. 301. *Kerner* Bäume T. 10. Franzöf. Hêtre, Fouteau. Englisch, Beech-tree.

Sie

Sie wächst in allen Gegenden von Europa ; ihre Anzucht geschieht durch den Saamen, welcher am besten im Frühjahr ausgesät wird.

1. Männliche Blumen. 2. 3. 4. Vergrößerte einzelne Blumen. 5. Ein vergrößerter Staubfaden. 6. Weibliche Blumen. 7. u. 8. Vergrößert. 9. u. 10. Zeitige Früchten. 11. u. 12. Saamen. 13. u. 14. Keimende Pflänzgen.

Pl. 565.

Lathyrus odoratus L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 198.

567. Wohlriechende Platerbse. *Linn. syst. veg.* S. 663. ed. M. *syst. plant.* p. III. S. 465. ed. R. *Comm. hort.* 2. 219. T. 80. *Linné Pflanzen syst.* VIII. 598. *Sukow angew. Bot.* II. 702. Franzöf. Le Pois d'odeur.

Sie wird in unsern Gärten, wegen dem vorzüglich angenehmen Geruch, und schönen Blumen gezogen.

1. Eine zeitige Schote. 2. Der Saame.

Pl. 566.

Geranium rotundifolium L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 199.

568. Rundblättriger Storchschnabel. *Linn. S. V. S.* 618. ed. M. *syst. plant.* p. III. S. 328. ed. R. *Fl. suec.* 575. *Scop. Fl. Carn.* 846. *Hudson Fl. Angl.* T. I. 303. *Hall. helv.* 941. *Vaill. parif.* 79. T. 15. f. 1. *Linn. Pflanzen syst.* VIII. 422. *Sukow angew. Bot.* II. 684.

Wächst häufig an ungebauten Orten.

1. Eine vergrößerte Blume.

Pl. 567.

Prunus Avium L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 278.

569. Waldkirschenbaum. Wilde süsse Kirsche. Vogelkirschen. Holzkirschen. Twiefelbeere. Kasbeere. *Linn. S. V. S.* 463. ed. M. *syst. plant.* p. II. S. 487. ed. R. *Fl. suec.* 421. *Hudson Fl. Angl.* T. I. 187. *Blackw. T.* 425. *Linné Pflanzen syst.* I. 749. *Sukow angew. bot.* II. 305. *Du Roi* II. 170. *Cramer T.* 16. *Bellermann T.* 14. *Gleditsch Forstw.* 810. *Kerner Bäume T.* 30.

Diesen bei uns in den Holzungen wildwachsender Kirschenbaum pflegt man in Baumschulen zu säen, um auf die jungen Stämme andere zu pfropfen.

1. Zweit-

1. Zwitterblumen. 2. Eine Blume aufgeschnitten und vergrößerte. 3. Der Kelch. 4. Ein vergrößerter Staubfaden. 5. Ein Blumenblatt. 6. Das Pistill. 7. Zeitige Kirschen. 8. Eine rothe Abart. 9. Eine schwarze aufgeschnitten. 10. 11. u. 12. Saamen.

Pl. 568.

Solanum Dulcamara L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 140.

570. Steigender Nachtschatten. Bitterfüß. Je länger je lieber. Alfsranken. Alpranken. Waldnachtschatten. *Linn.* syst. veg. S. 223. ed. M. syst. plant. p. I. S. 511. ed. R. Fl. suec. 201. *Murray.* mat. med. 423. *Mill.* dict. 8. *Scop.* Fl. Carn. 287. *Pollich.* hist. 228. *Oeder* Fl. Dan. T. 607. *Tournef.* inst. 149. *Blackw.* T. 34. *Linné* Pflanzen syst. II. 207. *Du Hamel* II. 208. *Gleditsch* Forstw. II. 139. *Kerners* Bäume T. 41.

Franzöf. Douce-amere. Vigne Vierge. Englisch, Bittersweet.

Dis schlingende Gewächs findet sich bei uns, so wie in ganz Europa, an Gräben, Dämmen, Wassern und feuchten Orten, und ist officinell.

1. Eine vergrößerte Blume. 2. Ein Blumenblatt. 3. Der Kelch. 4. Vergrößerte Staubfaden. 5. Das Pistill. 6. Zeitige Beeren. 7. Eine aufgeschnitten. 8. Ein Saame. 9. u. 10. Vergrößert. 11. 12. 13. Keimende Pflänzgen.

Pl. 569.

Holcus Saccharatus L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 80.

571. Zucker-Moorhirse. Zucker-Pferdgras. *Linn.* syst. veg. S. 905. ed. M. syst. plant. p. IV. S. 308. ed. R. *Linné* Pflanzen syst. XII. 770. *Sukow* angew. Bot II. 857.

Sie ist in Indien zu Hause, wo sie sowohl statt des Brodes, als zum Getränke benutzt wird.

1. Eine Zwitterblume. 2. Der Fruchtknoten mit einer Granne. 3. Eine geschlossene männliche Blume. 4. Diese geöffnet.

Pl. 570.

Atriplex alba L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 164.

572. Weiße Gartenmelde. *Sukow* angew. bot. II. 577. *Bauh.* pin. 119.

Sie ist in der Tartarey einheimisch, und wird zuweilen in unsern Gärten gezogen, wo sie wie Spinat verbraucht wird.

Pl. 571.

Pl. 571.

Hypochaeris radicata L. Beckmann Landwirthschaft. §. 103.

573. Saukraut. Langwurzlichtes Ferkelkraut. *Linn.* syst. veg. S. 721. ed. M. syst. plant. p. III. S. 662. ed. R. Fl. suec. 709. *Pollich.* pal. 756. *Hudson* Fl. Angl. T. II. 347. *Scop.* Fl. Carn. 987. *Linné* Pflanzensyst. IX. 114.

Es wächst durch ganz Europa auf Wiesen und in Wäldern wild.

Pl. 572.

Juniperus Sabina L. Beckmann Landwirthschaft. §. 281.

574. Sevenbaum. Sadebaum. Sagebaum. Segelbaum. *Linn.* syst. veg. S. 894. ed. M. syst. plant. p. IV. S. 276. ed. R. *Scop.* Fl. Carn. 1228. *Murray* mat. med. 41. *Gmel.* Fl. sib. I. 183. *Hall.* hist. 1662. *Du Hamel* II. 187. *Blackw.* T. 214. *Linné* Pflanzensyst. II. 469. *Du Roi* I. 350. *Kerner* Bäume T. 6. f. 1. v. *Oelhaven* T. 26.

Franzöf. Sabine, Savinier. Englisch, Savine-tree.

Er wächst in Portugall, Spanien, Italien, und dem Oriente wild. In der Arzneikunst wird das Oel gebraucht.

1. Männliche Blumen. 2. Weibliche Blumen. 3. Der Saame.

Pl. 573.

Lamium purpureum L. Beckmann Landwirthschaft. §. 199.

575. Rother Bienenfaug. Rothe Taubenessell. *Linn.* syst. veg. S. 534. ed. M. syst. plant. p. III. S. 50. ed. R. Fl. suec. 521. *Mill.* dict. n. 1. *Pollich.* hist. 556. *Scop.* Fl. Carn. 701. *Hall.* hist. 272. *Oeder* Fl. Dan. T. 523. *Blackw.* T. 183. *Linn.* Pflanzensyst. VII. 463. *Sukow.* angew. bot. II. 495.

Er wächst in Europa an ungebauten und gebauten Orten und macht auf Aekern und in Gärten ein häufiges Unkraut.

1. Die Staubfäden.

Pl. 574.

Salix fusca L. *Sukow* angew. Bot. II. 44.

576. Die braune Weide. *Linn.* syst. veg. S. 880. ed. M. syst. plant. p. IV. S. 232. ed. R. Fl. suec. 897. *Jacq.* H. Vind. 297. *Linn.* Pflanzensyst. IV. 565. *Sukow* a. a. O.

Eine

Eine kleine niedrige Weide, welche in Europa in feuchten Gegenden angetroffen wird.

1. Männliche Kätzgen. 2. Eine Schuppe mit zween Staubfäden. 3. Ein Staubfaden vergrößert. 4. Weibliche Kätzgen. 5. Der Fruchtknoten. 6. Ein Zweig mit Blätter.

Pl. 575.

Lapsana Communis L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 199.

577. Gemeiner Rainkohl. *Linn. syst. veg.* S. 721. ed. M. *syst. plant.* p. III. S. 663. ed. R. *Fl. suec.* 649. *Gmel. Fl. sib.* II. 40. *Scop. Fl. Carn.* II. 988. *Pollich. pal.* 757. *Hudson Fl. Angl.* T. II. 347. *Oeder Fl. Dan.* T. 500. *Hall. helv.* 6. *Linné Pflanzen-syst.* IX. 115.

Wächst in Europa in Wäldern, Dörfern, und in Gärten, und gehört unter die beschwerlichen Unkräuter.

Pl. 576.

Rumex Crispus L. *Sukow angew. Bot.* II. 602.

578. Krauser Ampfer. Grindwurz. Meugelwurz. Zitterwurz. Krötenblätter. *Linn. syst. veg.* S. 346. ed. M. *syst. plant.* p. II. S. 115. ed. R. *Fl. suec.* 314. *Pollich. hist.* 356. *Scop. Fl. Carn.* 441. *Hall. hist.* 1589. *Linn. Pflanzen-syst.* VI. 368. *Sukow a. a. O.*

Englisch, Dock.

Er wächst in Europa an feuchten Orten, und könnte nach *Gleditsch* zur Gerberei genutzt werden.

1. Eine vergrößerte Zwitterblume.

Pl. 577.

Lathyrus Latifolius L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 119.

579. Breitblättrige Platerbse. *Linn. syst. veg.* S. 663. ed. M. *syst. plant.* p. III. S. 468. ed. R. *Fl. suec.* 1139. *Mill. dict.* 13. *Hudson. Fl. Angl.* T. I. 316. *Hall. helv.* 433. *Scholl barb.* 580. *Linné Pflanzen-syst.* VIII. 605. *Sukow angew. Bot.* II. 701.

Sie wächst bei uns an Hecken und in Wäldern. In Gärten kann sie zur Bekleidung von Spalieren dienen.

1. Eine aufgesprungene und reife Hülse.

Pl. 578.

Pl. 578.

Salix Amygdalina L. *Beckmann* Landwirthschaft. §. 275.

580. Mandelblättrige Weide. *Linn.* syst. veg. S. 879. ed. M. syst. plant. p. IV. S. 224. ed. R. Fl. suec. 881. *Mill.* dict. 5. *Pollich.* hist. 917. *Hall.* helv. 151. hist. 1636. *Linné* Pflanzenyst. II. 406. *Sukow* angew. Bot. II. 38. *Du Roi* II. 394.

Sie wächst in Europa in Wäldern und an Wassergräben, und bleibt in ihrem Wuchs sehr niedrig.

1. Männliche Kätzgen.
2. Eine Schuppe mit 3 Staubfäden.
3. Weibliche Kätzgen.
4. Der Fruchtknoten.
5. Die Saamenkapfel.

Pl. 579.

Lithospermum arvense L. *Beckmann* Landwirthschaft. §. 103.

581. Acker-Steinsaamen. *Linn.* syst. veg. S. 185. ed. M. syst. plant. p. I. S. 385. ed. R. Fl. suec. 160. *Hall.* helv. 518. *Scop.* Fl. Carn. 187. *Pollich.* hist. 184. *Mill.* dict. 2. *Oeder* Fl. Dan. T. 456. *Hall.* hist. 594. *Blackw.* T. 436. *Linné* Pflanzenyst. V. 410.

Er wächst in Europa auf Fruchtfeldern als ein Unkraut. Die Wurzel gibt eine schöne rothe Farbe.

1. Ein Blümchen.
2. Zeitige Saamen.

Pl. 580.

Viscum album L. *Sukow* angew. Bot. II. 81.

582. Der gem. Mistel. Kerster. Affelter. *Linn.* syst. veg. S. 883. ed. M. syst. plant. p. IV. S. 240. ed. R. Fl. suec. 905. *Hall.* helv. 162. *Scop.* Fl. Carn. 1217. *Pollich.* hist. 926. *Tournef.* inst. 610. *Blackw.* T. 184. *Du Hamel* act. paris. 1740. T. 22. 24. *Murray* mat. med. I. 199. *Linné* Pflanzenyst. IV. 579. *Du Hamel* II. 266. *Miller* IV. 635. *Gleditsch* verm. Abh. I. 219. *Forstw.* II. 132. *Forstmagaz.* I. 110.

Er ist ein parasitisches Gewächs, welches sich nur auf andern Bäumen findet. Die Zweige werden in der Arzneikunde gebraucht.

I

1. Männ-

1. Männliche Blumen. 2. u. 3. Eine davon vergrößert mit den Staubgefäßen.
4. Weibliche Blumen. 5. u. 6. vergrößert. 7. Zeitige Beeren. 8. Eine vergrößert.
9. Aufgeschnitten. 10. Ein Saame.

Pl. 581.

Pyrus Malus Sylvestris L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 278.

583. Der wilde Apfelbaum. Holzapfelbaum. *Linn. syst. veg.* S. 466. ed. M. S. plant. p. II. S. 501. ed. R. mat. med. 237. *Hall. helv.* 351. *Scop. Fl. Carn.* 599. *Hall. hist.* 1097. *Tournef. inst.* 635. *Blackw. T.* 141. & 178. *Linné Pflanzen syst.* I. 787. *Sukow angew. bot.* II. 331. *Du Roi* II. 226. *Gleditsch Forstw.* II. 77. *Sieffert* I. 107. *Kerner Bäume* T. 23.

Franzöf. Pommier. Englisch, Apple-tree.

Der Wuchs dieses bei uns einheimischen Baumes, ist niedrig. Die wilden Aepfel dienen zu Cider, so wie zum Most und Branntenweinbrennen.

1. u. 2. Zwitterblumen. 3. Staubfäden. 4. Staubwege. 5. Ein Blumenblatt.
6. Ein vergrößerter Staubfaden. 7. Ein zeitiger Apfel. 8. Aufgeschnitten. 9. u. 10. Samen. 11. u. 12. Keimende Pflänzgen.

Pl. 582.

Agaricus Muscarius L. *Sukow angew. Bot.* II. 925.

584. Fliegenblätter-Schwamm. *Linn. S. V. S.* 974. ed. M. syst. plant. p. IV. S. 599. ed. R. Fl. suec. 1076. *Hudson. Fl. Angl. T.* II. 612. *Pollich. pal.* 1157. *Gleditsch Fung.* 82. *Scop. Fl. Carn.* 12. *Hall. helv.* 2373. *Schæff. Fung. T.* 27. 28. *Linné Pflanzen syst.* XIII. 440. *Kerner gift. u. esb. Schwämme* T. 7.

Auf Wiesen und in Wäldern. Er dient zur Vertreibung der Fliegen, und gehört unter die giftigen Schwämme.

Pl. 583.

Malva Verticillata L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 121.

585. Quirlblumige Malve. *Linn. syst. veg.* S. 626. ed. M. syst. plant. p. III. S. 348. ed. R. *Mill. dict.* n. 5. *Jacq. Hort. Vind. T.* 40. *Burm. Fl. ind.* 149. *Rai. hist.* 598. *Linné Pflanzen syst.* VIII. 457.

Diese ist in China und auf dem Vorgebürge der guten Hoffnung zu Hause.

1. Eine Blume. 2. Die Frucht. 3. Ein Saame.

Pl. 584.

Pl. 584.

Matricaria chamomilla L. *Beckmann* Landwirthschaft. §. 103.

586. Chamille. *Linn.* syst. veg. S. 774. ed. M. syst. plant. p. III. S. 853. ed. R. Fl. suec. 702. *Murr.* app. med. T. I. 63. *Gmel.* Fl. sib. II. 200. *Pollich.* pal. 815. *Hudson* Fl. Angl. T. II. 372. *Hall.* helv. 101. *Scop.* Fl. Carn. I. 374. *Linné* Pflanzen-syst. IX. 488. *Sukow* angew. bot. II. 758. *Pörner* I. 285. 446. f.

Sie wächst in Europa auf Aekern, und ihre Blüthen, so wie das wesentliche Oel derselben, sind officinell.

Pl. 585.

Mercurialis Annua L. *Beckmann* Landwirthschaft. §. 199.

587. Jähriges Bingelkraut. *Linn.* syst. veg. S. 890. ed. M. syst. plant. p. II. S. 265. ed. R. *Mill.* dict. n. 1. *Scop.* Fl. Carn. 1226. *Hudson* Fl. Angl. T. II. 435. *Pollich.* pal. 932. *Blackw.* T. 162. *Hall.* helv. 1600. *Linné* Pflanzen-syst. X. 290. *Sukow* angew. Bot. II. 635.

Es ist ein bekanntes Unkraut, in unsern Gärten, dessen Kraut officinell ist.

1. Männliche Blume. 2. Weibliche Blume.

Pl. 586.

Pyrus Communis pyrafter L. *Beckmann* Landwirthschaft. §. 278.

588. Der wilde Birnbau. *Linn.* S. V. S. 466. ed. M. syst. plant. p. II. S. 500. ed. R. *Hall.* helv. 351. hist. 1096. *Scop.* Fl. Carn. 598. *Blackw.* T. 453. *Linné* Pflanzen-syst. I. 784. *Du Roi* II. 207. *Du Hamel* II. 153. *Gleditsch* Forstw. II. 73. *Kerner* Bäume T. 22. *Bellermann* T. 35. *Cramer* T. 19.

Franzöf. Poirier. Englisch, Peartree.

Er findet sich in ganz Europa wild, und es stammen von ihm wahrscheinlich die zahmen Arten her, von denen er sich durch seine mit Stacheln besetzte Zweige, und die kleinen herben und unangenehmen Früchte unterscheidet.

1. Zwitterblumen. 2. Der Kelch. 3. Die Staubwege. 4. Staubfäden. 5. Einer vergrößert. 6. Ein Blumenblatt. 7. Zeitige Früchten. 8. u. 9. Größere Sorten. 10. Ein Saame.

Pl. 587.

Mespilus chamæmespilus L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 277.

589. Der Zwergmispel. *Linn. syst. veg.* S. 466. ed. M. *syst. plant.* p. I. S. 499. ed. R. *Scop. Fl. Carn.* 592. *Hall. hist.* 1090. helv. 353. *Mill. dict. n.* 8. *Jacq. Vind.* 243. *Linné Pflanzenyst.* III. 652. *Sukow angew. bot.* II. 324. *Pyrus chamæmespilus Ehrhardt* in *Hirschfelds Calender* 1785. n. 9. *Mönchs Verz.* 59.

Er wächst auf den Schweizer-Oestreichischen- und Pyrenäischen-Alpen, und seine Früchten sind essbar.

1. Ein zeitiger Saame.

Pl. 588.

Betula Alnus L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 265.

590. Die gemeine Erle. Eller. Erlenbaum. *Linn. S. V. S.* 849. ed. M. *syst. plant.* p. IV. S. 127. ed. R. *Hall. helv.* 157. *Gmel. Fl. sib.* I. 171. *Tournef. inst.* 587. T. 359. *Hall. hist.* 1633. *Du Hamel I. T.* 15. *Cramer T.* 12. *Linn. Pflanzenyst.* II. 280. *Sukow angew. Bot.* II. 72. *Du Roi I.* 100. *Hellot.* 210. *Pörner I.* 397. 385. 513. *Sieffert II.* 227. *Thunb. Fl. jap.* 76. *Gleditsch verm. Abh.* II. 422. *Forstw. I.* 422. *Forstmagaz. V.* I. XI. 88. *Kerner Bäume T.* 14. Franzöf. Aulne. Englisch, Alder-tree.

Sie wächst in Europa an Wassergräben und Bächen sehr häufig, und wird auch in Amerika angetroffen.

1. Männliche Kätzgen. 2. Weibliche Kätzgen. 3. u. 4. Vergrößerte männliche Geschlechtstheile. 6. Ein weibliches Kätzgen vergrößert. 7. Der Fruchtknoten. 8. Halbzeitige Zapfen. 9. u. 10. Zeitige Zapfen. 11. 12. 13. Saamen.

Pl. 589.

Myosotis Arvensis L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 394.

591. Mausohr. Kleines Vergis mein nicht. *Linn. syst. veg.* S. 184. ed. M. *syst. plant.* p. I. S. 383. ed. R. *Fl. suec.* 157. *Scop. Fl. Carn.* 185. *Pollich. hist.* 181. *Hall. hist.* 590. *Linné Pflanzenyst.* V. 404.

Wächst in ganz Europa auf Aekern und andern trokenen Feldern.

Pl. 590.

Pl. 590.

Nigella Damascena L. *Beckmann* Landwirthschaft. §. 195.

592. Damascenischer Schwarzkümmel. Schabab. Jungfer im Gras. *Linn.* syst. veg. S. 506. ed. M. syst. plant. p. II. S. 621. ed. R. *Kram.* austr. 153. *Mill.* dict. 2. T. 187. f. 2. *Blackw.* T. 558. *Linné* Pflanzensyst. VII. 270. *Sukow* angew. Bot. II. 659. Franzöf. Nielle. Poivrette. Englisch, Fennel-flower.

Wächst im südlichen Europa auf den Kornfeldern wild; seine Saamen können als Gewürze dienen.

Pl. 591.

Oenothera biennis L. *Sukow* angew. Bot. II. 628.

593. Zweijährige Nachtkerze. Rübrapünzel. Weinblume. Nachtschlüsselblume. *Linn.* syst. veg. S. 358. ed. M. syst. plant. p. II. S. 147. ed. R. *Hall.* hist. 994. *Oeder* Fl. Dan. T. 446. *Mill.* dict. I. ic. T. 189. f. 2. *Pollich.* hist. 368. *Scop.* Fl. Carn. 451. *Linné* Pflanzensyst. VI. 143. *Sukow* a. a. O. *Reichart* III. 186.

Franzöf. Herbe aux ânes. Englisch, Tree Primrose.

Sie ist in Virginien einheimisch, und wird wegen ihrer im ersten Jahre eßbaren Wurzeln in Gärten gezogen.

1. Der Kelch. 2. Zeitige Saamenkapseln. 3. Diese entzweigesehritten. 4. Saamen.

Pl. 592.

Quercus pedunculata L. *Beckmann* Landwirthschaft. §. 263.

594. Die Sommer-Eiche. Stieleiche. Augusteiche. Masteiche. *Sukow* angew. Bot. II. 257. *Du Roi* II. 240. *Cramer* T. 2. f. 1. 2. *Kerner* Bäume T. 9. v. *Oelhaven* T. 3. *Quercus femina* *Linn.* *Gleditsch* verm. Abh. I. 23.

Sie wächst in unsern Waldungen zwischen der Klumpeiche, (*Quercus robur* L.) und ihre Blätter und Blumen brechen früher als an dieser hervor. *Linné* machte sie zur Abänderung von der Klumpeiche; ist aber nach mehreren Beobachtungen eine eigene Art.

1. 2. 3. Halbzeitige Früchten. 4. u. 5. Ganz zeitige. 6. Galläpfel. 7. Eine keimende Pflanze.

Pl. 593.

Pl. 593.

Orchis Bifolia L. *Beckmann Landwirthschaft* §. 439.

595. Zweiblättrige Ragwurz. Weißer Guckguck. Heyrathswurzel. Biesamknabenkraut. Stendelwurz. Orchis. *Linn.* S. V. S. 808. ed. M. syst. plant. p. IV. S. 5. ed. R. Fl. suec. 723. *Mill.* dict. 3. *Hudson* Fl. Angl. T. II. 382. *Pollich.* pal. 841. *Blackw.* T. 588. *Hall.* helv. 1285. *Scop.* Fl. Carn. 244. *Linné* Pflanzen syst. XI. 534. *Sukow* angew. bot. II. 775.

Wächst auf rauhen Triften in Europa, und kann als Gartenblume dienen, welche die Bienen häufig besuchen.

Pl. 594.

Orchis Militaris L. *Beckmann Landwirthschaft* §. 439.

596. Helmartige Orchis. Kriegerische Ragwurz. *Linn.* syst. veg. S. 809. ed. M. syst. plant. p. IV. S. 10. ed. R. Fl. suec. 725. *Mill.* dict. 3. *Hudson* Fl. Angl. T. II. 384. *Gmel.* Fl. sib. I. 14. *Scop.* Fl. Carn. I. 249. *Hall.* helv. 1277. *Jacq.* Fl. austr. T. 176. *Tournef.* inst. 438. T. 247. *Pollich.* pal. 426. *Sukow* angew. bot. II. 776. *Linné* Pflanzen syst. XI. 550.

Sie wächst bei uns in Wäldern, und hat verschiedene Abänderungen, sie gehört auch zu denen Bienenpflanzen.

1. Eine vergrößerte Blume.

Pl. 595.

Pyrus Cydonia L. *Beckmann Landwirthschaft* §. 222.

597. Der Quittenbaum. *Linn.* syst. veg. S. 467. ed. M. syst. plant. p. II. S. 503. ed. R. mat. med. 238. *Kalm.* it. 3. 107. *Tournef.* inst. 632. 633. T. 405. *Blackw.* T. 137. *Linné* Pflanzen syst. I. 791. *Sukow* angew. bot. II. 337. *Du Roi* II. 231. *Gleditsch* Forstw. II. 79. *Du Hamel* I. 204. *Hausvater* III. 325. *Mönchs* Verz. 92. *Sieffert* I. 16.

Franzöf. Coignier. Englisch, Guince-tree.

Dieser bei uns wildwachsende Quittenstrauch wird durch Pfropfen auf Birnstämme veredelt. Es gibt einige Abänderungen von ihm.

Pl. 596.

Pl. 596.

Pastinaca Sativa L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 168.

598. Pastinaken. Balsternaken. Hammelsmöhren. *Linn.* S. V. S. 290. ed. M. syst. plant. p. I. S. 719. ed. R. Fl. suec. 259. *Mill.* dict. 1. 2. *Pollich.* hist. 303. *Scop.* Fl. Carn. 332. *Hall.* hist. 808. *Blackw.* T. 379. *Linné* Pflanzen syst. VI. 186. *Sukow* angew. bot. II. 562. *Reichart* III. 141. *Lueders* Briefe 183. 316. *Mills* Feldw. III. 202.

Franzöf. Panais. Englisch, Parsnip.

Diese Pflanze, welche in Europa wild wächst, wird wegen ihrer essbaren Wurzeln in Gärten gezogen.

Pl. 597.

599. Die essbare Wurzel von dem Garten-Pastinak, *P. Sativa* L.

Pl. 598.

Salix fragilis L. *Beckmann Landwirthschaft.* §. 275.

600. Bruchweide. Glasweide. Kräckweide. *Linn.* S. V. S. 879. ed. M. syst. plant. p. IV. S. 225. ed. R. Fl. suec. 883. *Mill.* dict. 6. *Pollich.* hist. 918. *Linné* Pflanzen syst. II. 409. *Sukow* angew. Bot. II. 39. *Du Roi* II. 396.

Sie wächst bei uns an Ufern und Gräben, und dient zur Einflechtung der Zäune.

1. Männliche Kätzgen. 2. Eine Schuppe mit zween Staubfäden. 3. Weibliche Kätzgen. 4. Der Fruchtknoten. 5. Die Saamenkapsel.

Pl. 599.

Salix purpurea L. *Sukow* angew. Bot. II. 40.

601. Die purpurrothe Weide. *Linn.* S. V. S. 879. ed. M. syst. plant. p. IV. S. 226. ed. R. Fl. suec. 884. *Pollich.* hist. 919. *Scop.* Fl. Carn. 1209. *Mill.* dict. 7. *Hall.* hist. 1640. *Linné* Pflanzen syst. IV. 153. *Sukow* a. a. O. *Hausvater* V. 299.

Sie

Sie macht einen hohen Baum, und scheint viel Aehnlichkeit mit *S. helix* zu haben.

1. Männliche Kätzgen. 2. Eine Schuppe mit zween Staubfäden. 3. Weibliche Kätzgen. 4. Der Fruchtknoten. 5. Die Saamenkapfel.

Pl. 600.

Polygonum frutescens L. *Beckmann* Landwirthschaft. §. 81.

602. Daurischer Buchwaizen. Strauchartiger Knöterich. *Linn.* S. V. S. 376. ed. *M. syst. plant.* p. II. S. 203. ed. R. *Gmel.* Fl. sib. III. 60. T. 12. f. 1. 2. *Tournef.* Cor. 38. *Linné* Pflanzenyst. VI. 436.

Er wächst in Sibirien und Dauren. In Schweden hat man schon Versuche mit diesem Buchwaizen gemacht, um ihn als Getreide zu nützen.

Ende des VI. Bandes.

In Commission der Cottaischen Buchhandlung in Tübingen.



Abricot précoce.



Abricot d'Hollande.



Abricot commun.



Abricot pêche.



Caulalis grandiflora L.



Aegopodium podagraria L.



Veronica triphyllos L.



Allium viviparum L.



Nira aquatica L.

1871

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000



Vicia sylvatica L.



Glycine apios L.





Xanthium strumarium L.



Sempervivum tectorum L





Brassica oleracea rubra



Anethum Dulce Mill.



Die Gurkelrübe.



Anthemis arvensis L.



Populus tremula L.



Opuntia...



Cheiranthus incanus L.



Arbutus Uva ursi L.



Aristolochia Clematilis L.

112



Handwritten text, likely a title or description, possibly reading "Hesperis matronalis" or similar.



Ribes rubrum L.



Asperula tinctoria L.



Melampyrum arvense L.



Cynara scolymus L.



Der Blumenknopf von der Artischoke.



Cynara Cardunculus L.



Lathyrus aphaca L.



Ranunculus muricatus L.

1157



Chamaenerion



Betula alnus incana L.



Ribes alpinum L.



Viburnum opulus L.



Prunus insititia L.



Teltierrübe.



Erica vulgaris L.



Tanacetum vulgare L.



Sambucus Laciniata β.



Bupleurum rotundifolium L.



Rubus fruticosus L.



Carduus nutans L.



Salsola kali L.



Trifolium arvense L.



Brassica Capitata fimbriata



Butterkraut.



Chærophylloides sylvestre L.



Chærophylloides temulum L.




Chenopodium album L.



Chenopodium viride L.



Chenopodium hybridum L.



Chrysanthemum hybridum



Chenopodium polyspermum L.

本草綱目



卷之四



Chrysanthemum Leucanthemum L.



Phytolacca americana



Hyssopus officinalis L.



Die Mayrube.



Cornus alba L.



Handwritten text, likely a label or description, written in a cursive script.



Crataegus aria L.



Scherardia arvensis L.



Cucurbita pepo L.



Die Kürbis.



Cucurbita verrucosa L.



Dracocephalum moldavica L.



Eleagnus angustifolia L.



Erysimum barbarea L.



Erysimum alliaria L

100

100



100



Fagus sylvatica L.



Lathyrus odoratus L.



Geranium rotundifolium L.



Prunus avium L.





Solanum dulcamara L.



Sorghum saccharatum.



Atriplex alba.



Hypochaeris radicata L.



Juniperus sabina L.



Lamium purpureum L.



Salix fusca L.



Lapsana communis L.



Rumex crispus L.



Lathyrus latifolius L.




Salix amygdalina L.



Lithospermum arvense L.



Discum album L.






Pyrus malus sylvestris L



Agaricus muscarius L.



Malva verticillata L.





Matricaria chamomilla L.



Mercurialis annua L.



Monarda minima L.



Pyrus Communis Pyraster L.



Mespilus chamaemaspilus L.



Betula alnus L.



Myosotis arvensis L.



Nigella Damascena L.



Oenothera biennis L.



Quercus pedunculata Ehrh. 5



Handwritten text, possibly a signature or date, located below the watermark. The text is written in a cursive or script style and is difficult to decipher due to fading.



Orchis bifolia L.

50



Carduus riparius L.



Orchis militaris L.



Pyrus Cydonia L



Pastinaca sativa.



Handwritten text, likely a species name or description, written in cursive script.



Die Pastinakwurzel




Salix fragilis L.



Salix purpurea L.



Polygonum frutescens L.





Kerner, Johann Simon

Abbildung aller ökonomischen Pflanzen

Bd.: 6.

Stuttgart (1793)

Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek -- 4 Nat 459 -6

urn:nbn:de:bvb:12-bsb11220603-0

VD18 15541517-001